

[REDACTED] 12. Februar 2024 [REDACTED]

Notfallbericht vom 12.02.2024

[REDACTED] geb. [REDACTED] 999/W
[REDACTED]

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir berichten Ihnen über oben genannte Patientin.

Hauptdiagnosen

1. HWS-Distorsion ED 12.02.2024
2. Schulterprellung rechts ED 12.02.2024
3. Thoraxkontusion rechte Apertur ED 12.02.2024

Allergien

Medikamente: keine bekannt

Anamnese

Es erfolgte die notfallmässige Selbstzuweisung. Die Patientin war als Beifahrerin um 13:00 Uhr an einem Verkehrsunfall bei geringer Geschwindigkeit von etwa 20 km/h verwickelt, wobei ein anderes Auto mit der Beifahrerseite kollidiert ist. Angegurtet, kein Kopfanprall. Airbags wurden nicht ausgelöst. Selbstständig das Fahrzeug verlassen und beschwerdefrei die Formalitäten mit der Polizei geklärt. Anschliessend nach Hause, dort hätten sich Nacken- und Schulterschmerzen rechts mit Schwindel und Kopfschmerzen, die vom Nacken ausstrahlten entwickelt. Kein Erbrechen.

Sonst gesund, keine Allergien bekannt. Dauermedikation mit Eisen und Folsäure. Schwangerschaft wird verneint.

Verlauf

CT-graphisch keine Traumafolgen der HWS und des Thorax, konventionell-radiologisch keine Hinweise auf eine Fraktur der rechten Schulter. Laborchemisch unauffällig stabiles Hämoglobin. Im Urin wenige Erythrozyten, die CT-graphisch erfassten Oberbauchorgane ergaben keine Hinweise auf eine Organlazeration. In der ergänzenden Sonographie des Abdomens konnte freie Flüssigkeit ausgeschlossen werden. Der Patientin wurde die stationäre Aufnahme zur Überwachung angeboten. Die Patientin entschied sich in gutem Allgemeinzustand ohne neurologische Einschränkungen oder abdominelle Beschwerden für den Austritt nach Hause in Begleitung des Ehemanns.

Status / Lokalstatus

Patientin in gutem Allgemeinzustand, selbstständig mobil, kann sich selber entkleiden.

Neuro: GCS 15, wach und orientiert. Kein Druckschmerz, keine Wunde, keine Rötung, keine Schwellung. Kein Kalottenklopschmerz. Pupillen isochor, mittelweit, prompte direkte und konsensuelle Lichtreaktion. Hirnnerven III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII orientierend intakt. Gebiss stabil.

HWS: Ossäre Druckdolenz mit paravertebalem Hartspann und schmerzbedingt eingeschränkter Rotation. Leichter axialer Stauchungsschmerz. Kraft und Motorik beidseits an allen Extremitäten orientierend intakt, mit vollständig intakter Sensibilität. Druckdolenz über dem rechten proximalen Humerus, mit frei beweglicher Schulter, sowie Schmerzen über der 2./3. Rippe rechts apikal und in Kompressionsschmerz in der Axilla rechts. Kein Klopfeschmerz über dem Sternum, keine Thoraxschmerzen, kein Kompressionsschmerz im Beckenbereich.

Abdomen: Keine Gurtmarken oder Hämatome, rege Darmgeräusche, weiches Abdomen ohne Resistenzen oder Klopfeschmerz über allen vier Quadranten, kein Rüttelschmerz.

Cor: Reine, pulssynchrone, rhythmische Herztöne ohne pathologische Herzgeräusche.

Pulmo: Beidseits belüftete Lunge mit vesikulärem Atemgeräusch, keine Rasselgeräusche, keine Zeichen der Obstruktion.

Beurteilung / Prozedere

- Kontrolle des Urinstatus und klinische Kontrolle durch den Hausarzt am Dienstag. Bei anhaltender Mikrohämaturie Empfehlung zur urologischen Vorstellung.
- Lokale Wärmeapplikation nach Massgabe der Beschwerden.
- Analgesie nach Massgabe der Beschwerden.
- Bei neurologischen Auffälligkeiten oder abdominellen Beschwerden wurde die unverzügliche ärztliche Wiedervorstellung besprochen.

Medikamente neu

| Wirkstoff | Markenname | Mo | Mi | Ab | Na | Bem. zur Einnahme |
|--|--------------------------------------|----|----|----|----|--|
| Ibuprofen Lactose-1-Wasser Natrium Filmtabl 400 mg 26.67 mg 0.828 mg | Brufen Ibuprofen 400 mg 1 Tabl. | 1 | 1 | | 1 | Stk p.o. Bei starken Schmerzen. |
| Pantoprazol Natrium Filmtabl 40 mg 6.75 mg | Pantozol 40 mg 1 Tabl. | 1 | | | | Stk p.o. Bei regelmässiger Brufeneinnahme. |
| Metamizol natrium Metamizol natrium-1-Wasser Filmtabl 500 mg 500 mg | Novalgin Novaminsulfon 500mg 1 Tabl. | | | | | Stk p.o. Bei Schmerzen alle 6 Stunden 1-2 Tabletten. |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Paracetamol Sorbitol Saccharose Schmelztab 500 mg 30.5 mg 105.8-109.2 mg | Dafalgan Direct Schmelztabl 500mg 1 St. | | | | | Stk p.o. Bei Schmerzen alle 6 Stunden 1-2 Tabletten. |
|--|---|--|--|--|--|--|

Freundliche Grüße

non vidit, non dixit.

Dr. med.

Dieser Bericht wurde elektronisch visiert.

Labor

Siehe Beilagenblatt